

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA SUBCUTÂNEA



UPAE- SERRA TALHADA



SERRA TALHADA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP



ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA SUBCUTÂNEA

Elaborado por:

Aprovado por:

Gabrielle Ferreira Leite Coelho
COREN: 468752
Atualizado: AGOSTO/ 2022

Flávia Figueiredo Petty

Marcelo Alexandre de Lima Coelho

1. DEFINIÇÃO

Aplicação de medicamento no tecido subcutâneo.

2. OBJETIVOS

- Absorção gradual e sistêmica de medicamentos por via parenteral;
- Obter uma absorção mais rápida pela via enteral.

3. INDICAÇÃO

Pacientes com necessidade de administração de insulina, anticoagulantes, vacinas ou outros medicamentos indicados por esta via.

4. PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR PROCEDIMENTOS.

- Equipe de Enfermagem.

5. MATERIAIS A SER UTILIZADO

- EPI's (luvas de procedimentos);
- Bandeja ou cuba rim;
- Algodão embebido em álcool a 70%;
- Agulhas descartáveis de 4, 5, 6 e 8 cm com dispositivo de segurança;
- Biombo S/N.

6. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Esclarecer o procedimento ao paciente e familiares;
- Certificar a prescrição médica, observando a medicação, administração, dosagem e horário;
- Higienizar as mãos;
- Ler o rótulo e a dosagem do medicamento verificando a data e lote;
- Aspirar medicação com seringa apropriada e agulha adequada;
- Levar a medicação até o paciente na cuba rim;
- Verificar se o nome do paciente confere com a prescrição;
- Calçar as luvas de procedimento;
- Escolher o local para aplicação do medicamento (deltóide, face externa do braço e face externa e anterior da coxa, face interna do antebraço ou região abdominal e região escapular);
- Fazer a assepsia do local com algodão embebido com álcool a 70%;
- Fazer uma prega na pele com o dedo indicador e polegar da mão não dominante;
- Introduzir a agulha em ângulo de 90° na pele com a mão dominante;
- Proceder a aspiração antes de injetar o medicamento, para certificar-se que nenhum vaso sanguíneo foi atingido;
- Injetar o líquido empurrando lentamente o embolo;



SERRA TALHADA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP



ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA SUBCUTÂNEA

Elaborado por:

Gabrielle Ferreira Leite Coelho
COREN: 468752
Atualizado: AGOSTO/ 2022

Aprovado por:

Flávia Figueiredo Petty

Marcelo Alexandre de Lima Coelho

- Segurar a pele com algodão sem massagear o local;
- Observar a reação no local;
- Reposicionar o paciente confortavelmente no leito;
- Descartar a agulha e a seringa em local próprio;
- Retirar as luvas;
- Higienizar as mãos;
- Checar a prescrição médica;

7. PONTOS IMPORTANTES E POSSÍVEIS RISCOS

- Não reencapar agulhas;
- Evitar aplicação próxima a região inguinal, articulações e cicatrizes umbilical, na cintura e na linha mediana do abdome;
- Mudar diariamente o local de aplicação;
- Observar o estado geral do paciente antes, durante e após aplicação;
- Está contraindicado em casos de situações emergenciais como: choque hipovolêmico, distúrbio grave de coagulação, grandes queimaduras e desidratação graves.

8. RESULTADOS ESPERADOS

- Resposta farmacológica adequada, com melhora do quadro apresentado.

9. REFERÊNCIAS

ARAÚJO, M.J.B.de. Técnicas fundamentais de enfermagem. 9 Ed. Rio de Janeiro: MJB de Araújo, 1996.

FIGUEIREDO, N.M.A.; VIANA, D.L.; MACHADO, W.C.A. Tratado prático de enfermagem. 2 ED.V.2. São Caetano do Sul: Yedis Editora, 2008.

STACCIARINI, T.S.G.; CUNHA, M.H.R. Procedimentos Operacionais Padrão em Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2014.